

# 국내 말라리아 관련 헌혈 제한지역

2018년 8월 29일 시행

| 지역<br>연도    | 인 천 |     |   | 강 원 | 경 기 |     |     | 북 한        |
|-------------|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|------------|
|             | 강화군 | 옹진군 | 영종·용유도 <sup>1)</sup><br>무의도 <sup>2)</sup> | 철원군 | 파주시 | 김포시 | 연천군 | 백두산 제외 전지역 |
| 2016년~2018년 | 제한  | 가능  |   | 제한  | 제한  | 가능  | 제한  | 제한         |

1) 영종·용유도 지역 : 중구 남북동, 덕교동, 운남동, 운북동, 운서동, 을왕동, 중산동

2) 무의도 지역 : 중구 무의도

\* 말라리아 관련 헌혈 제한지역에 11월에서 다음해 3월까지 한시적으로 거주한 자는 헌혈가능.

## 헌혈금지 약물 및 예방접종

아래의 약물, 주사제는 혈액 및 수혈자의 건강에 영향을 미칠 위험이 있으므로  
현재 또는 과거에 복용한 경험이 있는 경우 일정기간 동안 헌혈에 참여하실 수 없습니다.

### ■ 태아에 영구적인 손상을 일으킬 위험이 있는 약물

| 헌혈보류기간 | 종 류        | 상품명 / [성분명]   |
|--------|------------|---|
| 영구배제   | 건선 치료제     | 티가손·타가손·테지손 / [에트레티네이트]                                   |
| 3년     | 건선 치료제     | 네오티가손·소리아탄 / [아시트레틴]                                      |
| 6개월    | 전립선비대증 치료제 | 아보다트 등 / [두타스테라이드]  |
| 1개월    | 전립선비대증 치료제 | 프로스카 등 / [피나스테라이드]  |
| 1개월    | 남성 탈모증 치료제 | 프로페시아 등 / [피나스테라이드]                                       |
| 1개월    | 여드름 치료제    | 로스탄·아크날·뉴티논·로아큐탄(아큐탄)·아큐넬·이소트렌<br>이소티나·트레틴·핀플 / [이소트레티노인] |
| 1개월    | 습진약        | 알리트레티노인   |

### ■ 기타약물 및 주사제

| 헌혈보류기간 | 종 류  |
|--------|--|
| 영구배제   | 사람 뇌하수체에서 추출한 성장호르몬, 소에서 추출한 인슐린, 면역억제제, 변종크로이츠펠트-야콥병 위험지역에서 채혈된 혈액의 혈청으로 제조된 진단시약 |
| 1년     | 태반주사제, 혈액응고인자  |
| 2주     | 티클로피딘  |
| 1주     | 항생제(주사포함)*, 스테로이드제(주사포함), 보톡스(주사), 클로피도그렐 등  |
| 3일     | 아스피린   |

\*항생제(약)-감기치료 목적인 경우에는 3일

### ■ 예방접종

| 헌혈보류기간 | 종 류  |
|--------|--|
| 1년     | B형간염 면역글로불린<br>동물에게 물린 후 광견병 예방접종, 국내에서 허가 받지 않은 예방접종  |
| 1개월    | 수두, BCG예방접종, 상처 후 파상풍, 인플루엔자생백신(비강흡입),<br>MMR(홍역,유행성이하선염,풍진의혼합백신)  |
| 2주     | B형간염, 황열, 경구용 소아마비, 경구용 장티푸스   |
| 24시간   | 콜레라, 디프테리아, 인플루엔자, A형간염, 주사용 장티푸스, 주사용 소아마비,<br>파상풍, 백일해, 일본뇌염, 유행성출혈열, 탄저병, 공수병, 폐렴구균<br>자궁경부암(가다실, 서바릭스) |